6 21361 70042 4

711004EU11-20200113

AGTIV

POTATO
Liquid

POMME DE TERRE
Liquide

MYCORRHIZAL INOCULANT IN LIQUID SUSPENSION
INOCULANT MYCORHIZIEN EN SUSPENSION LIQUIDE
DE MYKORRHIZA-IMPFMITTEL IN FLÜSSIGER LÖSUNG
NL MYCORRHIZA-SCHIMMELS IN VLOEIBARE VORM
PT INOCULANTE MICORRÍZICO EM SUSPENSÃO LÍQUIDA

950 ml
(950 g)
NET VOLUME
VOLUME NET
NETTOVOLUMEN
NETTO GEWICHT
VOLUME LÍQUIDO

2-8°C **STORE IN A COOL PLACE. DO NOT FREEZE PRODUCT.**
ENTREPOSER AU FROID. NE DOIT PAS GELER.
DE AN EINEN GEKUEHLTEN ORT AUFBEWAHREN. PRODUKT NICHT EINFRIEREN.
NL OP EEN KOELE LOCATIE BEWAREN. HET PRODUCT NIET INVRIEZEN.
PT CONSERVAR EM LOCAL FRESCO. NÃO CONGELAR O PRODUTO.

EN

POTATO
Mycorrhizal inoculant in liquid suspension
Glomus intraradices: 10 500 viable spores/g

Keep out of reach of children and animals. In case of eye contact, rinse thoroughly with water In case of contact with open wounds, clean with soap and water.

FR

POMME DE TERRE
Inoculant mycorhizien en suspension liquide
Glomus intraradices: 10 500 spores viables/g
FR : AMM 1150023 par Premier Tech GHA SAS
BE : ENGRAIS
Inoculum d'endomychorize en suspension
Numéro de dérogation : EM006.F
Détenteur de la dérogation : Premier Tech GHA SAS - TERREAUX DE FRANCE SAS. BP6 LE CIRON, F-49680 VIVY

Tenir hors de portée des enfants et des animaux. En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec blessures ouvertes nettoyer avec de l'eau et du savon.

DE

KARTOFFEL
Mykorrhiza-impfmittel in flüssiger Lösung
Glomus intraradices: 10 500 lebensfähige Sporen/g

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit offenen Wunden mit Wasser und Seife reinigen.

NL

AARDAPPELEN
Mycorrhiza-schimmels in vloeibare vorm
Glomus intraradices: 10 500 levensvatbare sporen/g
BE : MESTSTOF
Inoculum van mycorrhiza in suspensie
Ontheffingsnummer: EM006.F
Houder van de ontheffing : Premier Tech GHA SAS - TERREAUX DE FRANCE SAS. BP6 LE CIRON, F-49680 VIVY

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. In geval van oogcontact, grondig spoelen met water. In geval van contact met open wonden, reinigen met zeep en water.

PT

BATATA
Inoculante micorrízico em suspensão líquida
Glomus intraradices: 10 500 esporos viáveis/g

Manter fora do alcance das crianças e animais. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com feridas abertas, limpar com água e sabão.

Product of Canada / Produit du Canada / Produkt Kanadas
Geproduceerd in Canada / Produto do Canadá

PREMIER TECH

+33 (0)2 41 52 51 71 • PTAGTIV.COM

Premier Tech Agriculture
Le Ciron, BP 6, 49680 Vivy, FRANCE

EN

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product. AGTIV® is a registered trademark of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech GHA SAS.

FR

Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du manufacturier. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale. AGTIV® est une marque de commerce enregistrée de Premier Tech Ltée utilisée sous licence par Premier Tech GHA SAS.

DE

Dieses Produkt muss gemäß den Einschränkungen und Empfehlungen des Herstellers verwendet werden. Premier Tech Ltd. und seine verbundenen und/oder lizenzierten Unternehmen erlauben es nicht, dieses Produkt neu zu for-mulieren und/oder aufzubereiten, um ein kommerzielles Produkt zu erzeugen. AGTIV® ist eine eingetragene Marke von Premier Tech Ltd., die von Premier Tech GHA SAS unter Lizenz verwendet wird.

NL

Dit product moet worden gebruikt volgens de beperkingen en aanbevelingen van de fabrikant. Premier Tech Ltd. en zijn gelieerde en/of bedrijven onder licentie verbieden dat de herformulering en/of de herconditionering van dit product tot een commercieel product leidt. AGTIV® is een gedeponeerd handelsmerk van Premier Tech Ltd. onder licentie gebruikt door Premier Tech GHA SAS.

PT

Este produto tem de ser usado de acordo com as restrições e recomendações do fabricante. A Premier Tech Ltd. e as suas empresas afiliadas e/ou licenciadas não permitem a reformulação e/ou o recondicionamento deste produto para gerar qualquer produto comercial. AGTIV® é uma marca comercial registada da Premier Tech Ltd. usada sob licença da Premier Tech GHA SAS.

Product of Canada • Produit du Canada • Produkt Kanadas
Geproduceerd in Canada • Produto do Canadá

NL MYCORRHIZA-SCHIMMELS IN VLOEIBARE VORM

AGTIV® POTATO • Liquid is ontwikkeld met PTB297-technologie. Het product is aangepast aan de gebruikte apparatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling tijdens de behandeling van pootaardappelen of wanneer het in voren wordt aangebracht.

TOEPASSINGSSCHEMA

De hoeveelheid water die moet worden toegevoegd in de vloeistoftank volgens het benodigde debiet (per fles AGTIV® POTATO • Liquid).

DEBIET (L/ha)	WATER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

TOEPASSING IN DE VOOR

Giet de inhoud van één fles van 950 ml rechtstreeks in de vloeistoftank met de benodigde hoeveelheid water om een perceel van 4 hectare te behandelen. Raadpleeg dit toepassingsschema. Breng rechtstreeks aan op de zaden in de voor.

BEHANDELING VAN POOTAARDAPPELEN

Giet de inhoud van één fles van 950 ml rechtstreeks in een schone tank met de benodigde hoeveelheid water om een zaaibed van 4 hectare te behandelen. Rechtstreeks aanbrengen op de pootaardappelen.

ANALYSE VAN GEGARANDEERD MINIMUM

10 500 levensvatbare sporen *Glomus intraradices*/ml
BE: Ontheffingsnummer: EM006.F
Dichtheid: 1g/ml

AANBEVELINGEN

OP EEN KOELE LOCATIE BEWAREN. HET PRODUCT NIET INVRIEZEN.

Gebruik filters met openingen van ten minste **0,28 mm (≤ 50 mesh).**

Gebruik een membraanpomp voor de toepassing van het product (of een peristaltische pomp).

Schud de fles goed vóór gebruik en zorg voor een **constante en effectieve verdeling** in de tank tijdens het aanbrengen. **Verdeel de fles niet.**

Sproei in de voor **(maximale sproeibreedte: 18 cm)**

6h Toepassen binnen **6 uur** na het mengen in de vloeistoftank.

48h Behandel de pootaardappelen niet eerder dan **48 uur** voordat u gaat zaaien.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden. In geval van oogcontact, grondig spoelen met water. In geval van contact met open wonden, reinigen met zeep en water.
Bevat *Glomus intraradices*. Micro-organismen kunnen reacties van gevoeligheid veroorzaken.
Product bruikbaar in de biologische landbouw volgens de EG-verordening nr. 834/2007 van 28 juni 2007

PT INOCULANTE MICORRÍZICO EM SUSPENSÃO LÍQUIDA

AGTIV® POTATO • Liquid com a tecnologia PTB297. O produto é adaptado ao equipamento e permite uma distribuição uniforme durante o tratamento das sementes ou quando for aplicada num sulco.

GRÁFICO DE APLICAÇÃO

Volume de água a adicionar no depósito de líquido de acordo com o caudal necessário (por garrafa de AGTIV® POTATO • Liquid).

FLUXO (L/ha)	ÁGUA (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

APLICAÇÃO NO SULCO

No depósito de líquido, verta o conteúdo de um frasco de 950 ml no volume de água necessário para tratar 4 hectare de sementeira. Consultar o gráfico de aplicação. Aplicar diretamente nas sementes no sulco.

TRATAMENTO DE SEMENTES

Num depósito limpo, verta o conteúdo de um frasco de 950 ml no volume de água necessário para tratar a quantidade de sementes para 4 hectare de sementeira. Aplicar diretamente nas sementes.

ANÁLISE MÍNIMA GARANTIDA

10 500 esporos viáveis de *Glomus intraradices*/ml
Densidade: 1 g/ml

RECOMENDAÇÕES

CONSERVAR EM LOCAL FRESCO. NÃO CONGELAR O PRODUTO.

Usar filtros com aberturas de pelo menos **0,28 mm (malha ≤ 50).**

Usar uma bomba de diafragma para aplicação de produto (ou bomba peristáltica).

Agitar bem o frasco antes de usar e manter uma **agitação constante e eficaz** no depósito durante a aplicação. **Não dividir o frasco.**

Aspergir no sulco **(largura máxima de spray: 18 cm)**

6h Aplicar até **6 horas** depois de misturar no depósito de líquido.

48h Não inocular sementes mais de **48 horas** antes de semear.

Manter fora do alcance das crianças e animais. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Em caso de contacto com feridas abertas, limpar com água e sabão.
Contém *Glomus intraradices*. Os microrganismos podem causar reações de sensibilização.
Produto utilizável na agricultura biológica de acordo com a regulamentação CE nº 834/2007 de 28 de junho de 2007

AGTIV

POTATO
Liquid
POMME DE TERRE
Liquide

MYCORRHIZAL INOCULANT IN LIQUID SUSPENSION
INOCULANT MYCORHIZIEN EN SUSPENSION LIQUIDE
DE MYKORRHIZA-IMPFMITTEL IN FLÜSSIGER LÖSUNG
NL MYCORRHIZA-SCHIMMELS IN VLOEIBARE VORM
PT INOCULANTE MICORRÍZICO EM SUSPENSÃO LÍQUIDA

2-8°C

950 ml (950 g)
NET VOLUME • VOLUME NET • NETTOVOLUMEN
NETTO GEWICHT • VOLUME LÍQUIDO

PT**AGTIV**.COM

PREMIER TECH
Premier Tech Agriculture
Le Ciron, BP 6, 49680 Vivy, FRANCE +33 (0)2 41 52 51 71

711004EU14 - 20200113

EN MYCORRHIZAL INOCULANT IN LIQUID SUSPENSION

AGTIV® POTATO • Liquid is developed with PTB297 technology.The product is adapted to the equipment used and allows for a uniform distribution during the seed-piece treatment or when it is applied in furrow.

APPLICATION CHART

Volume of water to add in the liquid tank according to the flow rate needed (per bottle of AGTIV® POTATO • Liquid).

FLOW (L/ha)	WATER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

IN-FURROW APPLICATION

In the liquid tank, pour the contents of one 950 ml bottle in the volume of water required to treat 4 hectares of seedbed. Refer to the application chart. Apply directly on seed pieces in furrow.

SEED-PIECE TREATMENT

In a clean tank, pour the contents of one 950 ml bottle in the volume of water required to treat the amount of seed pieces for 4 hectares of seedbed. Apply directly on seed pieces.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

10 500 viable spores of *Glomus intraradices*/ml
Density: 1g/ml

RECOMMENDATIONS

STORE IN A COOL PLACE. DO NOT FREEZE PRODUCT.

Use filters with openings of at least **0.28 mm (≤ 50 mesh).**

Use diaphragm pump for product application (or peristaltic pump).

Shake the bottle well before use and maintain a **constant and effective agitation** in the tank during application. **Do not divide the bottle.**

Spray in the furrow **(maximum spray width: 18 cm)**

Apply within **6 hours** after mixing into the liquid tank.

Do not inoculate seed pieces more than **48 hours** before seeding.

Keep out of reach of children and animals.
In case of eye contact, rinse thoroughly with water.
In case of contact with open wounds, clean with soap and water.
Contains *Glomus intraradices*. Microorganisms can cause sensitization reactions.
Product usable in organic farming according to the EC regulation n ° 834/2007 of June 28, 2007

FR INOCULANT MYCORHIZIEN EN SUSPENSION LIQUIDE

AGTIV® POMME DE TERRE • Liquide est formulé à partir de la technologie PTB297. Le produit est adapté aux équipements utilisés et permet une distribution uniforme lors du traitement des plants ou lors de l'application dans le sillon.

CHARTE D'APPLICATION

Quantité d'eau à ajouter dans le réservoir selon le débit visé (par bouteille de AGTIV® POMME DE TERRE • Liquide).

DÉBIT (L/ha)	EAU (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

APPLICATION DANS LE SILLON

Dans le réservoir du pulvérisateur, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans la quantité d'eau nécessaire pour traiter 4 hectares de plants. Se référer à la charte d'application. Appliquer au plus près du plant dans le sillon.

TRAITEMENT DES PLANTS

Dans un réservoir propre, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans le volume d'eau requis pour traiter la quantité de plants pour 4 hectares. Appliquer directement sur les plants.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

10 500 spores viables de *Glomus intraradices*/ml
FR : AMM 1150023 par Premier Tech GHA SAS
BE : Numéro de dérogation : EM006.F
Masse volumique : 1g/ml

RECOMMANDATIONS

2-8°C ENTREPOSER AU FROID. NE DOIT PAS GELER.

Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à **0,28 mm (≤ 50 mesh)**.

Utiliser une pompe à diaphragme pour appliquer le produit (ou une pompe péristaltique ou à membrane).

Bien agiter le contenu de la bouteille avant utilisation et maintenir une **agitation constante et efficace** tout au long de l'application. **Ne pas diviser la bouteille.**

Pulvériser dans la ligne de plantation **largeur maximale du jet : 18 cm)**.

Appliquer le produit dans les **6 heures** suivant le mélange dans le réservoir.

Ne pas inoculer les plants plus de **48 heures** avant la plantation.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
En cas de contact oculaire, rincer abondamment à l'eau.
En cas de contact avec blessures ouvertes nettoyer avec de l'eau et du savon.
Contient *Glomus intraradices*. Les micro-organismes peuvent provoquer des réactions de sensibilisation
Produit utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE n° 834/2007 du 28 juin 2007

DE MYKORRHIZA-IMPFMITTEL IN FLÜSSIGER LÖSUNG

AGTIV® POTATO • Liquid wird mit der PTB297-Technologie entwickelt. Das Produkt ist an die verwendete Technik angepasst und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung während der Behandlung.

ANWENDUNGSTABELLE

Erforderliche Wassermenge, die in den Flüssigkeitstank zugegeben werden muss (pro Flasche AGTIV® POTATO-Liquid).

DURCHFLUSS MENGE (L/ha)	WASSER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

FURCHENBEHANDLUNG

Der Inhalt der 950-ml-Flasche wird mit der erforderlichen Wassermenge in den Beiztank gegeben. Geben Sie den Inhalt der 950 ml-Flasche in den Flüssigkeitstank. Diese Menge ist für 4 ha Saatbeet ausreichend, siehe hierzu auch die entsprechende Anwendungstabelle. Tragen Sie die Mischung direkt auf die Samen in der Furche auf.

SAATGUTBEHANDLUNG

Gießen Sie den Inhalt einer 950-ml-Flasche in das für die Behandlung erforderliche Wasservolumen für 4 Hektar in einen sauberen Tank. Ausbringung direkt auf die Pflanzgutstücke.

GARANTIERTE MINDESTANALYSE

10 500 lebensfähige Sporen von *Glomus intraradices*/g
BE : Abweichungs-Nr. : EM006.F

EMPFEHLUNGEN

AN EINEN GEKUEHLTEN ORT AUFBEWAHREN. PRODUKT NICHT EINFRIEREN.

Verwenden von Filtern mit einer Größe von mindestens **0,28 mm (50 Maschen)**.

Verwenden einer Membranpumpe für die Produktanwendung (oder eine Schlauchpumpe)

Vor Verwenden des Produktes **die Flasche gut schütteln.** Konstantes und effektives Rühren im Tank während der Anwendung.

Die Benetzungsbreite sollte **geringer sein als 18 cm**.

Innerhalb von **6 Stunden** nach dem Mischen aufbrauchen.

Saatgut nicht länger als **48 Std.** vor der Aussaat behandeln.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit offenen Wunden mit Wasser und Seife reinigen.
Enthält: *Glomus intraradices*. Mikroorganismen können Sensibilierungsreaktionen verursachen.
Produkt kann im ökologischen Landbau gem. EU-Verordnung-nr. 834/2007 vom 28. Juni 2007 verwendet werden.